

# 藥品使用指導單

## 妥寧<sup>®</sup>膜衣錠 (Tulip<sup>®</sup> 20 mg)

### ■ 藥品成分名

Atorvastatin

### ■ 藥品外觀

象牙白色，圓凸形，錠劑；大小：0.7 公分；標記：[HLA20]

### ■ 作用

妥寧<sup>®</sup>膜衣錠用來降低血中過高的膽固醇，以減少心血管疾病及中風的發作。

### ■ 用法

請按照醫師指示以足量開水吞服使用。

### ■ 注意事項

1. 如果有下列情形請先知會您的醫（藥）師：
  - 曾對本藥或類似藥物過敏。
  - 正在懷孕或哺乳，因此藥會傷害胎兒，故在服藥期間需確實避孕。
  - 正在服用其他藥物或健康食品。
  - 有肝腎疾病、肌肉無自主能力病史者，並須定期檢測肝功能。
  - 有飲酒習慣的人。
2. 若您有正在服用下列的藥品，請告知您的醫師或藥師：
  - 抗生素：Azithromycin、Erythromycin、Clarithromycin、Itraconazole。
  - 免疫抑制劑：Cyclosporin。
  - 其他降血脂藥品：Gemfibrozil、Ezetimibe。
3. 服藥期間不建議大量飲用葡萄柚汁。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若距離下一次服藥的時間小於12小時，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有下列狀況請勿驚慌：頭痛、腹瀉、嘔吐、胃腸脹氣、便秘，這些症狀會隨時間而慢慢減弱。
2. 若上述情況持續加重，或有下列情形發生，請立即與您的醫師聯絡：異常的肌肉疼痛、痙攣或不尋常的虛弱感、眼睛或皮膚四周出現黃疸現象、下背部疼痛、皮膚過敏。

## ■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0146

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮