

藥品使用指導單

萬克適[®]錠 (Arcoxia[®] 60 mg)

■ 藥品成分名

Etoricoxib

■ 藥品外觀

淺灰綠，不規則形，標記：[60 ARCOXIA][200]

■ 作用

骨關節炎(OA)與類風濕性關節炎(RA)之表徵與症狀的急/慢性治療、也用於治療急性痛風性關節炎、原發性經痛、僵直性脊椎炎、牙科手術後疼痛、婦科手術後疼痛。

■ 用法

- 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
- 請於固定時間服用。

■ 注意事項

- 進行冠狀動脈繞道手術(Coronary artery bypass graft, CABG)之後 14天內禁用本藥。
- 本藥會有可能造成腸胃不適，請勿空腹服用，若發生出血相關症狀，應先停藥，聯絡醫療人員確認是否可繼續使用本藥。
- 需進行拔牙或相關手術，請告知醫師或藥師。
- 本藥可能與其他藥物造成交互作用，若有進行其他藥物治療，請與醫師或藥師確認是否可併服。
- 有懷孕、哺乳，應告知您的醫生

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，會逐漸緩和：噁心、頭暈、腹脹等症狀。
- 若上述症狀加重，或有以下症狀，請盡快與醫師聯絡：呼吸困難、皮膚紅疹、異常出血（含腸胃道）、嘴唇、眼瞼、喉嚨出現腫脹或刺痛等問題。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-155

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮