

# 藥品使用指導單

## 里先安<sup>®</sup>膜衣錠(Lixiana<sup>®</sup> 60 mg)

### ■ 藥品成分名

Edoxaban

### ■ 藥品外觀

黃色圓形膜衣錠，標記：【DSC L60】

### ■ 作用

里先安<sup>®</sup>膜衣錠為一種抗凝血劑，能減少血栓形成的風險，並可幫助您預防心房纖維顫動所造成之中風與全身性栓塞。

### ■ 用法

- 不可在未先和醫師討論的情況下停用里先安<sup>®</sup>膜衣錠。
- 請遵照醫師處方之藥量每天服用一次，不可任意更改劑量。
- 里先安<sup>®</sup>膜衣錠不受食物響，可空腹或隨餐服用。

### ■ 注意事項

- 進行任何手術或任何侵入性治療前，請務必先告知您的醫師，您正在服用此藥品。
- 在任何情況下(包含拔牙及手術)，若沒有事先與原開藥醫師討論，不得停用此藥品，因可能增加您出現血栓與中風的風險。
- 若您計畫(已)懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 此藥品與其他抗凝血劑相同，對於出血風險較高的病患，建議謹慎使用。
- 必須確實依照醫師開立的處方服用此藥品，為了確保最佳預防血栓效果，切勿漏服任何一劑。
- 服用任何其他藥物前，請先詢問您的醫師或藥師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，會逐漸緩和：噁心、頭暈、腹脹、皮疹等症狀。
- 若上述症狀加重，或有以下症狀，請盡快與醫師聯絡：
  - 異常出血：皮膚出現瘀青或出血、流鼻血或傷口止血時間過長、咳血、吐血或吐出看似像咖啡渣的物質、血尿、焦黑色糞便、陰道異常出血，包括大量出血或經期變長。
  - 臉或手腫脹，嘴或喉嚨腫脹或刺痛，胸悶，呼吸困難。
  - 暈眩或突然頭痛。
  - 不明原因的疲勞。

**\*請隨身攜帶卡片或手圈註明您正在使用此藥以便發生意外時醫療人員可以得知你的服藥情況。**

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-156

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮