

藥品使用指導單

糖順平®膜衣錠 (Glyxambi® 25/5 mg)

■ 藥品成分名

Empagliflozin和Linagliptin

■ 藥品外觀

淺紅色、圓弧三角形錠劑；標記：[25/5]

■ 作用

糖順平®是一種複方製劑，主要用於輔助治療經飲食及生活習慣調整後，仍無法達到血糖控制目標的第二型糖尿病。糖順平®透過間接促進胰島素分泌、增加腎臟排出葡萄糖的機轉來達到改善血糖的目的。

■ 用法

- 建議劑量為每天早上服用一錠，可與食物併服或空腹服用。
- 醫師會根據目前的治療組合、治療效果與病人對藥物的耐受性做個人化的調整，因此請按醫囑服藥，勿自行增減藥量或任意停藥。

■ 注意事項

- 若您有以下情形，請告知您的醫(藥)師：
 - 若您是孕婦、哺乳中婦女、有肝腎方面疾病者。
 - 若您對糖順平®、糖漸平®或恩排糖®過敏。
 - 若您有服用其它藥物或保健食品(包括自行在藥房購買的)。
- 本藥與其他降血糖藥物併用時可能會造成低血糖，使用期間請務必留意血糖變化。
- 配合醫生指示控制飲食和適量運動有助於控制血糖。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 糖順平®最常見的副作用為泌尿或生殖部位的感染。在使用糖順平治療期間請留意是否有出現泌尿道感染的徵象和症狀，如頻尿、排尿會痛、有灼熱感、尿液呈現混濁狀或背後腰部或腹部疼痛等，並告知醫療人員以利即早治療。
- 其它嚴重但較罕見的副作用包括胰臟炎、急性腎臟損傷、會陰部壞死性筋膜炎、酮酸中毒等。如果開始服用糖順平後出現任何讓您困擾的症狀，請停用糖順平並立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

■ 發生低血糖該怎麼辦？

- 症狀：顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。
- 處理方式：
 - 血糖值小於 70 mg/dl：應立即進食含 15 公克易吸收含有糖份的食品，如含糖飲料或果汁 150 mL、3 顆方糖、2 包糖包、1 大匙蜂蜜、2 大匙葡萄乾、葡萄糖錠 3 顆。
 - 15 分鐘後測量血糖，若血糖沒有上升或症狀未改善，可再吃一次 15 公克易吸收含有糖份之食品（同上）；若低血糖症狀一直沒有改善，則應立刻送醫治療。
 - 如症狀改善，但距離下一餐還有一小時以上，建議喝一杯(240 mL)牛奶或食用一份點心避免再度發生低血糖。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0162

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮