

藥品使用指導單

貝坦利®持續性藥效錠 (Betmiga 50 mg)

■ 藥品成分名

Mirabegron

■ 藥品外觀

黃色橢圓形錠劑，標記【355】

■ 作用

- 可單用或和Vesicare衛喜康®(Solifenacin succinate)併用於治療伴有急尿、頻尿或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。
- 是目前新上市的β交感神經受體促進劑，其藥理作用並不會抑制逼尿肌收縮，所以急性尿滯留的副作用也可明顯減少。

■ 用法用量

- 建議劑量為一天一次，可隨餐或空腹服用。
- 應以水整粒吞服，不可嚼碎、切割或壓碎。

■ 注意事項

- Betmiga貝坦利®可能會升高血壓，建議定期量血壓(特別是高血壓病人)。
- 對本藥或其他賦形劑過敏者，請勿使用此藥。
- 不建議使用於膀胱出口阻塞、末期腎病或重度肝功能不全的病人，若有此情況請先告知您的醫(藥)師。
- 會經由乳汁代謝，如需哺乳請先告知您的醫(藥)師

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一個藥都有副作用，也不是每一個人都有可能有這些副作用。常見副作用如下：血壓增加、水腫、尿滯留、鼻咽炎、尿路感染、頭痛等。
- 若出現上述情況且持續加重，請立即與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0164

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮