

# 藥品使用指導單

## 佐能安<sup>®</sup>錠劑(Zonegran<sup>®</sup> 100 mg)

### ■ 藥品成分名

Zonisamide

### ■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；大小：1.3公分；標記：[P/132]

### ■ 作用

新診斷成人局部癲癇發作。

### ■ 用法用量

1. 佐能安<sup>®</sup>錠劑必須維持體內有固定藥量以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥，癲控達<sup>®</sup>錠劑請整粒吞服。
2. 空腹或隨餐使用均可。
3. 避免自行停藥，突然停藥可能引起癲癇發作，或增加發作頻率。
4. 按時回診，假如癲癇持續發作請與醫師聯繫。

### ■ 注意事項

1. 對zonisamide或磺胺類藥物(sulfonamides)過敏者，請勿使用此藥。年長者服用本藥，請特別注意副作用及跌倒的風險。
2. 服用zonisamide後曾引發嚴重的皮疹，包括史蒂文生氏-強生症侯群。(Stevens-Johnson Syndrome)、不明原因的疹子、皮膚紅腫、水泡或脫皮現象，請立即停用zonisamide並就醫。
3. 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有心血管疾病、肝病、腎臟病及正服用其他藥物或曾有藥物不良反應(抗癲癇藥)者，請先告知您的醫師。
4. 若需進行手術、拔牙，或其他緊急治療，請告知醫師正服用此藥。
5. 藥物交互作用 Orlistat, Ginkgo。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■可能的副作用

副作用	症狀	如何處理
很常見 (≥10%)	厭食、激動、易怒、混淆狀態、憂鬱、運動失調、頭暈、記憶力減退、嗜睡、複視	若症狀嚴重時(影響生活)請與醫師聯繫
嚴重	嚴重的皮疹，包括史蒂文生氏-強生症候群(SJS)、自殺意念與行為、嚴重免疫不良反應，包括皮疹、過敏反應及重大血液障礙(包括再生不良性貧血)、急性近視及次發性隅角閉鎖型青光眼、代謝性酸中毒	請立即就醫

## ■保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

■ 制訂單位/日期：藥劑部/2021.07

■ PFS-7200-166

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮