

# 藥品使用指導單

## 必治癲<sup>®</sup> 錠劑(Briviact<sup>®</sup> 100mg)

### ■ 藥品成分名

Brivaracetam

### ■ 藥品外觀

灰綠色之卵形膜衣錠，一側刻有 [u100]

### ■ 作用

1. 適用於 4 歲以上局部癲癇發作病人的治療。
2. 限用於局部癲癇發作之輔助治療 (add on therapy)。

### ■ 用法用量

必治癲<sup>®</sup> 錠劑必須維持體內有固定藥量以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。

### ■ 注意事項

1. 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
2. 使用此藥品前請勿吸煙、喝含酒精性的飲料及葡萄柚汁。
3. 按時回診，假如癲癇持續發作請與醫師聯繫。
4. 開始服藥期間，無法確定身體對藥物的反應，因為服用本藥後，可能會嗜睡、頭暈、疲倦、走路不穩，請避免需注意力集中的活動（例如：駕車、操作重機械或其他危險活動）。
5. 若有服用其他藥物(包括保健食品)請先告知醫生或藥師。
6. 若有計劃懷孕(或已懷孕)及哺乳婦女者，請先告知醫生。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■可能的副作用

副作用	症狀	如何處理
很常見 (≥10%)	暈眩、嗜睡	若症狀嚴重時(影響生活)請與醫師聯繫
≥1% 至 <10%	疲勞、行為或精神失常、無力及 眼球震顫等	若症狀持續未改善 且影響生活，請與 醫師聯繫
嚴重	自殺行為及意念、神經系統不良 反應(嗜睡、疲倦、暈眩及協調 障礙)、精神方面不良反應(行 為改變與精神病症狀)、過敏反 應(支氣管痙攣及血管性水腫)	請立即就醫

## ■保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/2021.07
- PFS-7200-0169

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮