

藥品使用指導單

優閒® 錠劑 (Keppra® 500mg)

■ 藥品成分名

Levetiracetam

■ 藥品外觀

淡黃，橢圓形，錠劑；大小：1.8公分；標記：[ucb，500]

■ 作用

控制癲癇或痙攣

■ 用法用量

- 優閒® 錠劑必須維持體內有固定藥量以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。

■ 注意事項

- 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
- 使用此藥品前請勿吸煙、喝含酒精性的飲料及葡萄柚汁。
- 按時回診，假如癲癇持續發作請與醫師聯繫。
- 開始服藥期間，無法確定身體對藥物的反應，因為服用本藥後，可能會嗜睡、頭暈、疲倦、走路不穩，請避免需注意力集中的活動（例如：駕車、操作重機械或其他危險活動）。
- 若有服用其他藥物(包括保健食品)請先告知醫生或藥師。
- 計畫懷孕、懷孕中、哺乳、腎臟疾病者或曾有藥物不良反應（抗癲癇藥過敏或有皮膚過敏史），請事先告知醫師。
- 若需進行手術、拔牙，或其他緊急治療，請告知醫師正服用此藥。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■可能的副作用

副作用	症狀	如何處理
很常見 (≥10%)	噁心、鼻咽炎、嗜睡、頭痛	若症狀嚴重時(影響生活)請與醫師聯繫
≥ 1% 至 < 10%	咳嗽、喉嚨乾或疼痛、肌肉疼痛、吞嚥困難、聲音改變	若症狀持續未改善且影響生活，請與醫師聯繫
嚴重	血球數量減少(嗜中性白血球減少症、顆粒性白血球缺乏症、白血球減少、血小板減少、全血球低下症)、自殺意念與行為	請立即就醫

■保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/ 2021.08
- PFS-7200-0172

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮