

藥品使用指導單

Molnupiravir 莫納皮拉韋

(COVID-19口服抗病毒藥物)

■ 藥品成分名

Molnupiravir 200 mg/膠囊

■ 藥品外觀

橘色不透明膠囊；標記：[82]

■ 適應症

- Molnupiravir為專案核准輸入緊急使用授權(EUA)藥品，適用於治療具有重症風險因子(懷孕不適用)，未使用氧氣且於發病5天內之 ≥ 18 歲之輕度至中度COVID-19確診病人，且無法使用其他建議藥物者。

■ 用法用量

- 每12小時服用4顆molnupiravir膠囊(如:上午8點和晚上8點，各4顆)
- 連續服用5天，未經醫師指示，請勿擅自更改劑量或停藥。
- 可隨食物或不隨食物服用molnupiravir。
- Molnupiravir膠囊應整顆吞服，切勿打開、破壞或壓碎膠囊。
- 若無法吞服整顆膠囊，請告知醫療照護人員，可考慮利用口服懸液劑方式服用，以下為臨床試驗(MOVE-IN/MK-4482-001)中利用鼻胃管/口胃管投予molnupiravir的藥物配置方法：

免責聲明：利用口服懸液劑方式給予病人molnupiravir的效用並未在臨床試驗中評估，原始試驗中的投予方式為每12小時口服一次。根據第二期臨床試驗(MOVE-IN/MK-4482-001)的資料，僅有5位受試者利用鼻胃管/口胃管投予molnupiravir，且molnupiravir中文說明書中並不推薦該方式給予藥物。



上圖截自衛生福利部疾病管制署Molnupiravir無法口服且有用藥需求之病患之口服懸浮液配置建議 (<https://www.cdc.gov.tw/File/Get/SGDk6KWHJi2R-iJu2lnDoQ>)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請諮詢醫師或藥師



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

藥品使用指導單

Molnupiravir 莫納皮拉韋

(COVID-19口服抗病毒藥物)

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 如果在**10小時**內想起，可盡快補服。
- 如果超過10小時，請等到下一次服藥時間再使用。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 副作用

- 常見副作用：腹瀉、噁心、暈眩、頭痛等。
- 如果您發生任何對您造成困擾或持續未緩解的副作用，請聯繫您的醫療照護人員。

■ 注意事項：

- 建議具生育能力者於藥物服用期間至結束後數天應**避孕**：女性持續**4天**，男性持續至少**3個月**。
- 建議使用molnupiravir治療期間和使用最後一劑molnupiravir後**4天內**不建議**餵哺母乳**。
- 專案核予EUA以提供病人使用，故因使用此藥物後發生不良反應導致死亡、障礙或嚴重疾病時，不適用藥害救濟。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處，避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

1. 默沙東Molnupiravir中文說明書(1110504版)
2. 公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物領用方案_1110616第6次修訂

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2022.06.21
- PFS-7200-0227

衛教單滿意度調查



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請諮詢醫師或藥師



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮