

# 藥品使用指導單

## 可滅喘®都保乾粉吸入器 Pulmicort® Turbuhaler

### ■ 藥品成分名

Budensonide

### ■ 作用

這是一個消炎（抗發炎）的藥品，可以減少氣管發炎的作用。

### ■ 用法

1. 旋轉並移去瓶蓋



2. 一手將吸入瓶直立，另一手控制底盤先向右旋轉到底後再向左旋轉到底，聽到“喀擦”一聲，即充填好一次劑量



3. 吸入前先呼一口氣



4. 將吸嘴含於兩唇之間，快速深深的吸一口氣



5. 深吸氣到底後盡可能閉氣 5-10 秒，然後將氣慢慢吐出



閉氣

6. 將瓶蓋歸位並旋緊



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 注意事項

1. 請在每次使用完後漱口，因為藉由漱口能有效降低聲音嘶啞及鵝口瘡等副作用的發生。
2. 若需吸入第二個劑量時，請在第一次吸入動作完成後隔 1-2 分鐘，再吸入下個劑量。
3. 因為所投予的粉末相當微量，您僅需依照前述方式使用，應可確保藥品已被吸入。


## ■ 如何知道藥品存量？

- 當視窗出現第一格紅色時表示剩下 20 次劑量，若視窗全部為紅色時，表示藥品已用完。



## ■ 如何清潔？

- 至少一星期清理吸入器一次。請以乾淨的酒精棉片或衛生紙擦拭吹嘴即可，藥罐不可放入水中。避免置於溫度過高的地方（如日曬處），且不須以吹風機吹乾。



參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2018.10.19
- PFS-7200-9004

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮