

# 藥品使用指導單

## 吸必擴<sup>®</sup>氣化噴霧劑 Symbicort<sup>®</sup>Rapihaler

### ■ 藥品成分名

Budensonide 160 mcg、Formoterol 4.5 mcg

### ■ 作用

- 可減少氣管發炎並使支氣管擴張，治療可逆性呼吸道阻塞

### ■ 用法



1. 第一次使用時，輕輕擠壓蓋子兩邊，並將蓋子打開，上下振搖5秒鐘後，按壓一次。本動作請做2次。
2. 吸入前請均勻上下振搖5秒鐘，打開蓋子。
3. 慢慢呼氣後把氣吐完，白色吸嘴以嘴唇含緊對準喉頭，確認瓶身保持直立。



4. 用手按壓吸入器頂部計數器使藥物噴出，同時透過嘴巴慢慢吸氣。
5. 持續吸氣至吸飽為止，並屏住呼吸10秒鐘。



6. 在開始吐氣之前，鬆開手指並將吸入器字嘴唇移開。
7. 若依照醫師指示需再使用第二口劑量，請間隔30秒後，重複第2~7步驟。
8. 吸入後請以清水漱口2次，以減少口咽部鵝口瘡發生風險。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 注意事項

1.請在每次使用完後漱口，因為藉由漱口能有效降低聲音嘶啞及鵝口瘡等副作用的發生。


2.若需吸入第二個劑量時，請在第一次吸入動作完成後隔30秒，再吸入下一個劑量。

3.因為所投予的粉末相當微量，您僅需依照前述方式使用，應可確保藥品已被吸入。

4.請勿冷藏或冷凍，若將藥品自鋁箔袋移出後，建議應儲存於室溫，不宜儲存於潮濕環境，避免結霜或陽光直射（不可高於50°C）。

## ■ 如何知道藥品存量？

當箭頭指示到黃色區域時，剩餘20口劑量。  
箭頭指示到紅色區域時，提醒您該回診囉！  
藥物已全部用完。



## ■ 如何清潔？

至少一星期清理吸入器一次。請以乾淨的酒精棉片或衛生紙擦拭吹嘴即可，且不須以吹風機吹乾。藥罐不可放入水中。



參考資料：

- 1. Micromedex
- 2. 藥品仿單

■ 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130，8132

■ 制訂單位/日期：藥劑部/2018.10.19

■ PFS-7200-9007

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮