

# 藥品使用指導單

## 鼻噴劑使用方法及注意事項

### ■ 藥品成分名

Nasonex 內舒拿鼻噴劑：Mometasone furoate

Pulmicort nasal aqua 能舒鼻鼻腔定量噴液劑：Budesonide

Nasacort AQ 拿塞可得鼻用噴液劑：Triamcinolone（上述屬於類固醇類鼻噴劑）

Butaro Nasal Spray 全妥噴鼻液：Butorphanol

Minirin nasal spray 迷你寧鼻腔噴霧劑：Desmopressin acetate

### ■ 藥品外觀

Nasonex 內舒拿鼻噴劑：綠色蓋子，白色瓶裝

Pulmicort nasal aqua 能舒鼻鼻腔定量噴液劑：棕色蓋子,棕色玻璃瓶身

Nasacort AQ 拿塞可得鼻用噴液劑：藍色蓋子，白色瓶裝

Butaro Nasal Spray 全妥噴鼻液：白色蓋子，棕色玻璃瓶身


Minirin nasal spray 迷你寧鼻腔噴霧劑：白色蓋子，棕色玻璃瓶身

### ■ 作用

類固醇類鼻噴劑用於治療鼻炎等上呼吸道、耳道症狀

Butaro Nasal Spray全妥噴鼻液用於頑固性疼痛

Minirin nasal spray迷你寧鼻腔噴霧劑用於尿崩症治療



### ■ 用法

（一）第一次用藥

- 充分搖動藥瓶並對空噴壓藥劑數次（3~5次），並觀察噴出為均勻霧狀。

（二）平常用藥

1. 擤鼻（清理鼻腔）。
2. 搖動藥瓶、移開瓶蓋。
3. 一手正確握住藥瓶，一手食指壓住一邊鼻孔，將噴頭插入鼻孔請將噴頭對準鼻翼，用手按壓噴瓶，使之噴出指定劑量的氣霧
4. 用鼻輕輕呼吸；如須第二噴，請隔30秒，重複步驟3，噴入第二噴鼻噴劑。
5. 類固醇類鼻噴劑需換手，於另一邊鼻孔重複整個程序。



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



### (三) 用藥後

- 用乾淨的紙巾或手帕將鼻噴劑噴嘴擦拭乾淨，蓋回蓋子。

## ■ 注意事項

- 噴頭部位用衛生紙擦乾淨即可，不需用水清洗。
- 藥品不需冷藏，除非藥袋上有特別指示。
- 藥品變色不可使用。

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速使用。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，會逐漸緩和：輕微搔癢。
- 若上述症狀加重，或有以下症狀，請盡快與醫師聯絡：若病情持續或更嚴重、給藥後鼻腔腫脹搔癢或燒灼感時。

## ■ 保存方法

- 藥品不需冷藏，除非藥袋上有特別指示。
- 瓶蓋要緊閉，儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2018.10.18
- PFS-7200-9016

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

