

# 藥品使用指導單

## 昂帝博®吸入膠囊 Ultibro®Breezhaler


### ■ 藥品成分名

Indacaterol 150 mcg, glycopyrronium 50mcg

### ■ 作用

- 可使支氣管擴張，達到緩解喘、咳、呼吸困難之效果，用於治療慢性阻塞性肺疾病。

### ■ 用法




1. 拔開帽蓋並完全打開吸入器（圖一、二）
2. 將膠囊從鋁箔片取出，放至於吸入器中央凹槽內。（圖三、四、五）
3. 蓋上吸入器並聽到喀擦聲。（圖六）
4. 吸入器向上，將兩邊按鈕同時壓到底後放開，即可刺破膠囊。請務必在刺破後放開兩側按鈕，勿持續按壓。（圖七、八）
5. 吐氣後，將吸嘴含於兩唇間，確保沒有縫隙。穩定吸入藥品至少五秒鐘，您會聽見呼呼的聲音。接著閉氣五到十秒，接著慢慢用鼻子呼氣。（圖九、十）

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮



6. 若您無法吸藥至少五秒，可分一至兩次吸入，大多數人在吸一至兩次後就能吸完藥品。（圖十一、十二）
7. 檢查膠囊內是否有殘留藥物，若有殘留，蓋上吸入器重複吸的動作。
8. 打開吸入器，倒出空膠囊並丟棄。（圖十三）

## ■ 注意事項

1. 請在每次使用完後檢查膠囊，確保膠囊內藥粉是否有吸完，若無，請同樣吸藥的動作再做幾次，確認有聽到呼呼聲，才是吸的力道有足夠。
2. 若需吸入第二個劑量時，請在第一次吸入動作完成後隔30秒，再吸入下個劑量。
3. 因為所投予的粉末相當微量，您僅需依照前述方式使用，應可確保藥品已被吸入。
4. 請勿冷藏或冷凍，若將藥品自鋁箔袋移出後，建議應儲存於室溫，不宜儲存於潮濕環境，避免結霜或陽光直射（不可高於50°C）。

## ■ 忘記使用藥品怎麼辦？

應儘速在同一天內使用藥品，同一天內請勿使用超過一次的劑量。

## ■ 如何清潔？

至少一星期清理吸入器一次。請以乾淨的酒精棉片或衛生紙擦拭吹嘴即可，且不須以吹風機吹乾。

參考資料：

- 1. Micromedex
- 2. 藥品仿單
- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130，8132
- 制訂單位/日期：藥劑部/107.10.19
- PFS-7200-9025

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮