

專案進口破傷風疫苗 Tetana 0.5 mL/amp

接種須知

■ 治療目的

預防破傷風。破傷風的致病原為破傷風桿菌。破傷風桿菌芽胞進入人體之方式，通常是經由受土壤、塵土或動物及人類糞便污染之穿刺傷口而入，另外也有可能透過撕裂傷、燒傷及一般傷口甚或由注射受污染之藥物而引起。壞死組織有利此種厭氣性破傷風桿菌增殖。最常見之臨床初症狀為腹部僵硬或肌肉痙攣，典型症狀為「角弓反張」及面部表情出現「痙笑」的特徵，伴隨強烈肌肉收縮疼痛。

■ 治療方法

深層皮下注射，一般於高位上臂肌肉（三角肌）接受注射。本品嚴禁血管內注射。基礎免疫：基礎免疫一共需接種三次。第一和第二次接種，每次劑量 0.5 mL，兩次間隔 4-6 周。第三次接種，每次劑量 0.5 mL，於第二次接種後 6-12 個月進行。追加免疫：近十年內無接種過含破傷風類毒素成分之疫苗者，接種一次進行追加免疫，每次劑量 0.5 mL。

■ 可能導致之副作用與危險

1. 請按照醫師指示以足量開水吞服使用。包括發燒、畏寒、冷感、多汗症、虛弱、全身乏力等。這些症狀通常在 24~48 小時內緩解。
2. 注射部位的紅、腫、熱、痛及鄰近部位與肢體的不適。

■ 預期治療效果

預防破傷風的方法就是按時接種破傷風疫苗。

■ 藥品資訊

Tetana® Tetanus vaccine adsorbed suspension for injection, 0.5 mL/amp，此疫苗為波蘭 IBSS BIOMED S.A. 公司製造，由國光生物科技公司經衛生福利部食品藥物管理署核准專案進口之產品，並已經食品藥物管理署檢驗合格封緘使用。

★ 本藥品未領有衛福部核發藥品許可證，不適用「藥害救濟法」。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮