

藥品使用指導單

臟得樂®錠 (Cordarone® 200 mg)

■ 藥品成分名

Amiodarone

■ 藥品外觀

白色，不規則形，錠劑；大小：1.05 公分；標記：[200]

■ 作用

臟得樂®膜衣錠用來降低血中過高的膽固醇，以減少心血管疾病、及中風的發作。

■ 用法

臟得樂®錠是一種抗心律不整藥，可用於治療及預防心律不整。

■ 注意事項

1. 請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
2. 臟得樂®錠藥效較慢，通常需要一至兩個星期才會出現藥效。
3. 臟得樂®錠可空腹或飯後服用，但請每天以相同方式服藥。
4. 服用臟得樂®錠期間請勿吃葡萄柚或喝葡萄柚汁。
5. 對臟得樂®錠過敏及懷孕婦女，請勿使用此藥。
6. 臟得樂®錠和許多藥都有可能產生交互作用，請務必告知醫師所有您正在服用的藥品，包括成藥、維他命、中草藥等。
7. 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有心、肺、肝、甲狀腺等方面的疾病，請先告知您的醫師。
8. 若您正服用其他心臟用藥（如：Digoxin）、抗凝血劑（如：Warfarin）、抗癲癇藥（如：Phenytoin），請告知您的醫師。
9. 請勿未經醫師同意突然停用臟得樂®錠，因為停用臟得樂®錠需要慢慢降低劑量再停藥。
10. 若需進行手術、拔牙，或其他緊急治療，請告知醫師您正服用此藥。
11. 臟得樂®錠可能會使您對光線較敏感，日曬後皮膚易變成藍灰色，出門請做好防曬。防護措施應維持至停藥後數週至數個月。
12. 服用臟得樂®錠期間，請按時回診及定期接受甲狀腺功能及視力檢查。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
2. 絕不可一次服用雙倍劑量。
3. 若忘記服藥 2 次以上，則請詢問醫師如何處理。

■ 可能的副作用

症狀	如何處理
噁心、嘔吐、便秘、食慾不振 腹痛	與食物一起服用可減輕
震顫、步行困難、虛弱、睡眠失調、頭痛、性功能障礙、體重減輕、味覺或嗅覺異常、視覺異常、畏光、乾眼、潮紅、上肢或下肢水腫、皮膚對光線敏感或變藍灰色	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
咳嗽、呼吸急促、呼吸時會痛 腹部腫脹、心跳快或不規則	請立即與醫師聯繫，這些症狀也可能出現在停藥後

■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0005

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮