

藥品使用指導單

胃斯妥®持效膠囊 (Gastro-Timelets® 30 mg)

■ 藥品成分名

Metoclopramide

■ 藥品外觀

明黃橙/淡黃橙色，長圓柱形，硬膠囊；大小：1 號；標記：無標記

■ 作用

胃斯妥®持效膠囊可用於紓解噁心、嘔吐、胃灼熱、腹部疼痛、脹氣、食慾不振，和餐後持續的脹滿感等上腸胃道蠕動不良之症狀。

■ 用法

1. 請遵照醫師指示服藥。
2. 一天服藥1次，飯前服用（飯前30分鐘）效果較好。
3. 胃斯妥®持效膠囊為長效劑型，應整粒吞服；以鼻胃管餵食的病人可以打開膠囊直接餵食，但請勿將膠囊內的顆粒磨碎。

■ 注意事項

1. 對胃斯妥®持效膠囊過敏，請勿使用此藥。
2. 若患有癲癇、帕金森氏症、出血、腸阻塞疾病、腎上腺瘤等疾病，不適合使用胃斯妥®持效膠囊。
3. 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有高血壓、心、肝、腎、帕金森氏症、精神方面等疾病，及正服用其他藥物者，請先告知您的醫師。
4. 服用期間請勿喝酒，酒精可能造成嗜睡之副作用發生率增加或加重。
5. 胃斯妥®持效膠囊可能會讓您覺得困倦，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。從事具潛在危險之活動（如開車、騎腳踏車、游泳等）應有人陪同。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
2. 絕不可一次服用雙倍劑量。

■ 可能的副作用

症狀	如何處理
困倦、不安、便秘或腹瀉	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
心跳異常，頭暈，四肢水腫，癲癇發作，嚴重肌肉僵直、手抖、痙攣，臉部、眼睛、舌頭、頸部頭部的不自主運動，呼吸困難	請立即與醫師聯繫

■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0008

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮