

藥品使用指導單

醣祿[®]錠 (Glucobay[®] 100 mg)

■ 藥品成分名

Acarbose

■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.7 公分；標記：[BAYER][G，100]

■ 作用

醣祿[®]錠用來治療第二型糖尿病患者，並藉由抑制腸道分解雙醣、寡醣及多醣，來延緩飯後血糖上升及降低您血中葡萄糖含量，使血糖維持在正常值。

■ 用法

1. 請遵照醫生指示服藥。
2. 通常於三餐進食時與第一口飯同時服用，或服用後立即用餐。
3. 不可因為覺得沒有不舒服的症狀而自行停藥。

■ 注意事項

1. 若您有以下情形，請告知您的醫（藥）師。
 - (1) 若您是孕婦、哺乳中婦女、有肝腎方面疾病、有腸道疾病者。
 - (2) 若您對醣祿[®]錠過敏。
2. 配合醫生指示控制飲食和適量運動才能有效控制糖尿病症狀，有助於您的健康。

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

1. 每一個藥都會有副作用，若您出現腸胃不適、腹瀉、脹氣等，請勿驚慌。若上述症狀持續且加重，請聯絡您的醫師。
2. 若發生下述情形請立即就醫：眼睛或皮膚顏色變黃。
3. 服用醣祿[®]錠可能造成低血糖症狀請小心（請見低血糖症狀處理方法）。

■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

■ 發生低血糖該怎麼辦？

- 症狀：顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。
- 處理方式：
 1. 血糖值小於 70 mg/dL：立即服用 120-180 毫升果汁或糖果 8-10 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
 2. 血糖值小於 50 mg/dL：立即服用 180-250 毫升果汁或糖果 10-15 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
 3. 若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。
 4. 當低血糖症狀發生時請勿駕車，以免發生危險。

■ 發生高血糖該怎麼辦？

- 症狀：例如異常口渴、疲倦、皮膚乾燥、呼吸困難、頻尿、沒胃口等。
- 處理方式：請測量血糖值並立即與您的醫師聯絡。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0010

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮