

# 藥品使用指導單

## 思樂康<sup>®</sup>錠 (Seroquel<sup>®</sup> 100 /25mg)

### ■ 藥品成分名

Quetiapine

### ■ 藥品外觀

100mg：淡黃橙，圓扁形，錠劑；大小：0.90 公分；標記：[SEROQUEL，100]

25mg：淺紅橙色，圓形，錠劑；大小：0.6 公分

### ■ 作用

思樂康<sup>®</sup>錠是一種非典型抗精神病藥物，可用於治療精神分裂症或躁鬱症，亦可用於因疾病引起的躁動症狀。

### ■ 用法

1. 請遵照醫師指示服藥勿自行更改劑量或停藥。
2. 一般需從低劑量開始服用，再慢慢增加劑量，請依照醫師指示療程，以達到最適合您的療效。

### ■ 注意事項

1. 對思樂康<sup>®</sup>錠過敏，請勿使用此藥。
2. 思樂康<sup>®</sup>錠和許多藥都有可能產生交互作用，請務必告知醫師所有您正在服用的藥品，包括成藥、維他命、中草藥等。
3. 若您正服用抗癲癇藥（如：Phenytoin）、紅黴素（Erythromycin）、抗黴菌藥（如：Ketoconazole）、其他抗精神病藥物、降血壓藥，請告知您的醫師。
4. 評估認為治療效益大於潛在危險時，才能在懷孕期間使用思樂康<sup>®</sup>錠。藥品分泌到人類乳汁的程度尚未知，婦女在服用思樂康<sup>®</sup>錠期間，最好避免以母乳哺育。
5. 不要喝酒精性飲料，請勿自行服用未經醫師處方的藥品。
6. 服用思樂康<sup>®</sup>錠期間，請按時回診及定期接受視力檢查。
7. 思樂康<sup>®</sup>錠可能會讓您覺得頭暈，動作不協調、視線模糊、困倦，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。從事具潛在危險之活動（如開車、騎腳踏車、游泳等）應有人陪同。
8. 思樂康<sup>®</sup>錠可能會使您容易體溫升高，當您運動或天氣較熱時，多喝水會對您有幫助。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

症狀	如何處理
頭暈、嗜睡、口乾、輕微無力 便秘、心搏過速、姿勢性低血壓、消化不良	通常發生在剛開始服藥或改變劑量時，若症狀持續或嚴重時請與醫師聯繫

## ■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0016

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮