

藥品使用指導單

癲通®長效膜衣錠 (Tegretol® CR 200 mg)

■ 藥品成分名

Carbamazepin

■ 藥品外觀

淺黃橙色，長圓柱形，錠劑；大小：1.22 公分；標記：[C，G][H，C]

■ 作用

癲通®長效膜衣錠是一種抗痙攣藥，可用來治療：

1. 控制癲癇或痙攣。
2. 治療周邊神經病變引起的疼痛，如：三叉神經痛。
3. 治療精神病，如：躁鬱症。

■ 用法

1. 癲通®長效膜衣錠必須在體內維持一定藥量以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
2. 癲通®長效膜衣錠請於飯後服用，可減少腸胃不適。
3. 癲通®長效膜衣錠為緩釋劑型，可剝半但不可磨粉，若需以鼻胃管餵食，請告知醫師。

■ 注意事項

1. 對癲通®長效膜衣錠或其他抗癲癇藥物過敏，請勿使用此藥。
2. 癲通®長效膜衣錠和許多藥都有可能產生交互作用，請務必告知醫師所有您正在服用的藥品，包括成藥、維他命、中草藥等。
3. 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有心血管疾病、肝病、腎病、骨髓抑制，及正服用其他藥物者，請先告知您的醫師。
4. 按時回診，假如癲癇持續發作請與醫師聯繫。
5. 不要喝酒精性飲料，請勿自行服用未經醫師處方的藥品。
6. 癲通®長效膜衣錠會使皮膚對光敏感，外出請做好防曬，可戴帽或撐傘。
7. 癲通®長效膜衣錠可能會讓您覺得頭暈，動作不協調、視線模糊、困倦，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。從事具潛在危險之活動（如開車、騎腳踏車、游泳等）應有人陪同。
8. 若需進行手術，拔牙，或其他緊急治療，請告知醫師正服用此藥。
9. 癲通®長效膜衣錠可能降低口服避孕藥的效果，請採用其他避孕方式。
10. 請勿未經醫師同意突然停止服用癲通®長效膜衣錠，如果您已使用癲通®長效膜衣錠一段時間，需要慢慢降低劑量才能停藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

症狀	如何處理
頭痛、頭暈、視線模糊或複視、幻覺、失眠、激動、不安（尤其是孩童）、困倦、言語不清、口乾、口腔或舌頭有刺激感、陽痿	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
噁心、嘔吐、腹瀉或便秘、腹痛、沒胃口	隨餐服用，若症狀持續或嚴重時請與醫師聯繫
皮膚出現小紫斑、意識混淆、心智改變、言語不清、眼球不自主運動、癲癇發作次數增加、下肢腫脹、不正常出血、血尿或血便、肌肉抽搐、手指及腳指麻木或刺痛、心跳異常、呼吸困難、胸痛	若發生這些副作用，請立即停藥並與醫師聯繫

■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/107.10.31
- PFS-7200-0016

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮