

# 藥品使用指導單

## 喜克脂<sup>®</sup>錠 (SimvaHEXAL<sup>®</sup> 20 mg)

### ■ 藥品成分名

Simvastatin

### ■ 藥品外觀

淡紅橙色，橢圓形，錠劑；大小：1.3公分；標記：[SIM 20]

### ■ 作用

喜克脂<sup>®</sup>錠用來降低血中過高的膽固醇，以減少心血管疾病及中風的發作。

### ■ 用法

依照醫師指示，於每天同一時間服用。

### ■ 注意事項

如果有下列情形請先知會您的醫（藥）師：

1. 對本藥或類似藥物過敏。
2. 正在懷孕或哺乳，因此藥會傷害胎兒，故在服藥期間需確實避孕。
3. 正在服用其他藥物或健康食品者。
4. 有肝腎疾病、肌肉無自主能力病史者，並須定期檢測肝功能。
5. 有大量飲酒習慣的人。
6. 若您有正在服用下列的藥品，請告知您的醫師或藥師：
  - 抗凝血劑：Warfarin（歐服寧）
  - 抗生素：Azithromycin（日舒錠）、Erythromycin（紅黴素）、Clarithromycin（開羅理黴素）
  - 免疫抑制劑：Cyclosporine（新體睦）
  - 其他降血脂藥品：Gemfibrozil（脂福）
7. 此藥禁止和葡萄柚汁併服！
8. 酒精可能會增加此藥的副作用，服藥期間，禁止飲酒。
9. 不可自行停藥，按照醫生的指示，注意食物的攝取應該減少脂肪，適度運動。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有下列狀況請勿驚慌：頭痛、腹瀉、胃腸脹氣、便秘，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
2. 若上述情況持續加重，或有下列情形發生，請立即與您的醫師聯絡：異常的肌肉疼痛、痙攣或無力、眼睛或皮膚四周出現黃疸現象、下背部疼痛、皮膚過敏、疹子。

## ■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0018

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮