

藥品使用指導單

善寧®持續藥效膠囊 (Xanthium® 200 mg)

■ 藥品成分名

Theophylline

■ 藥品外觀

白色，長圓柱形，硬膠囊；大小：1.93 公分；標記：無標記

■ 作用

善寧®持續藥效膠囊為支氣管擴張劑，可用來解除因氣喘或其他肺部疾病、引起的呼吸困難。

■ 用法

1. 善寧®持續藥效膠囊必須維持血中濃度以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
2. 善寧®持續藥效膠囊可空腹或飯後服用，但請每天以相同方式服藥。
3. 善寧®持續藥效膠囊為緩釋劑型，應整粒吞服；以鼻胃管餵食的病人可以打開膠囊直接餵食，但請勿將膠囊內的微膠粒磨碎。

■ 注意事項

1. 對善寧®持續藥效膠囊或茶鹼類藥物過敏，請勿使用此藥。
2. 善寧®持續藥效膠囊和許多藥都有可能產生交互作用，請務必告知醫師所有您正在服用的藥品，包括成藥、維他命、中草藥等。
3. 懷孕或計畫懷孕、哺乳、有心、肺、肝、腎、甲狀腺機能亢進、消化性潰瘍或癲癇等方面的疾病，請先告知您的醫師。
4. 茶、咖啡、可樂及抽菸可能影響藥品的作用；若您平日有喝茶或咖啡的習慣，請告知您的醫師，因為可能需要調整劑量。
5. 請按時回診，因為醫生可能需要監測您的血中藥物濃度及評估藥品的療效。
6. 若有需要就診，請告知他科醫師或牙醫您正服用此藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

症狀	如何處理
噁心、嘔吐、胃痛、腹痛、食慾差	隨餐或飯後馬上服用，或與制酸劑併用，若症狀持續未改善，請與醫師聯繫
頭痛、精神不安、急躁、暈眩、頻尿、頭及手指肌肉抽筋	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
失眠、心跳快速、心悸、呼吸急促	您的劑量可能需要調整，請與醫師聯繫
異常行為、心悸、心律異常、發燒、呼吸急促、出汗、極度口渴、耳鳴、肌肉抽筋、經常嘔吐（嘔吐物為咖啡色）	請立即與醫師聯繫
皮膚起疹、皮屑、水泡	請立即與醫師聯繫

■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0025

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮