

藥品使用指導單

癲能停®膠囊 (Dilantin® 100 mg)

■ 藥品成分名

Phenytoin

■ 藥品外觀

鮮紅橙/白色，硬膠囊；大小：3 號；標記：[PARKE，DAVIS][P-D，100]

■ 作用

癲能停®膠囊是一種抗痙攣藥，可用於治療：

1. 控制癲癇或痙攣。
2. 治療周邊神經病變引起的疼痛，如：偏頭痛、三叉神經痛。
3. 心肌收縮異常造成之心律不整

■ 用法

1. 癲能停®膠囊必須維持體內有固定藥量以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
2. 癲能停®膠囊請整粒吞服。
3. 制酸劑會影響癲能停®膠囊的藥效，請在服完癲能停®膠囊後 1 小時再服用制酸劑。
4. 管灌餵食的病人，請避免與食物一起以鼻胃管灌食，需間隔至少 2 小時。膠囊可打開直接以藥粉餵食，此藥易殘留於管壁上，建議灌完後以 10~30 c.c. 冷開水沖洗，避免藥粉黏附在管壁上。

■ 注意事項

1. 對癲能停®膠囊或其他抗癲癇藥物過敏，請勿使用此藥。
2. 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有心血管疾病、肝病、腎臟病及正服用其他藥物者，請先告知您的醫師。
3. 按時回診，假如癲癇持續發作請與醫師聯繫。
4. 不要喝酒精性飲料，請勿自行服用未經醫師處方的藥品。
5. 癲能停®膠囊若造成腸胃不適，可和食物併服。但請每天以相同方法服藥，使藥物吸收穩定。
6. 癲能停®膠囊可能會讓您覺得頭暈，動作不協調、視線模糊、疲倦，在未確定此藥對您有何影響之前如需開車或操作危險機械，請務必特別注意。
7. 若需進行手術、拔牙，或其他緊急治療，請告知醫師正服用此藥。
8. 癲能停®膠囊可能降低口服避孕藥的效果，請採用其他避孕方式。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

症狀	如何處理
牙齦紅、腫、出血 (較易發生在年輕人)	做好口腔衛生(刷牙、使用牙線)、按摩牙齦、定期作口腔檢查，若症狀嚴重時請與醫師聯繫
噁心、嘔吐、便秘、胃痛、味覺異常、體重減輕、吞嚥困難	可隨餐服用或飲用大量水分，若症狀持續未改善，請與醫師聯繫
困倦、頭暈、頭痛、毛髮增生、失眠	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
動作不協調、意識混亂、言語不清、視線模糊或複視、癲癇發作次數增加、肌肉抽搐、皮膚出現紫斑、不正常出血、呼吸困難、胸痛	若發生這些副作用時，請立即停藥並與醫師聯繫

■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0026

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮