

藥品使用指導單

寬心[®]錠 (Imdur[®] 60 mg)

■ 藥品成分名

Isosorbide-5-mononitrate

■ 藥品外觀

淡黃色，橢圓形，錠劑；大小：1.30 公分；標記：[A，ID]

■ 作用

寬心[®]錠為有機硝酸鹽，具有血管擴張作用，可改善心臟的血氧供應量，但因心絞痛是因心肌缺氧所引起的胸痛，通常心絞痛的時間會小於 15 分鐘，本品口服後約 30 分鐘以上才產生藥效，因此只用於預防或緩解胸痛心絞痛），無法用於解除心絞痛的急性症狀。

■ 用法

1. 請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
2. 寬心[®]錠請整粒吞服，空腹服用效果較好（飯前 1 小時或飯後 2 小時）。
3. 寬心[®]錠為緩釋劑型，可剝半但不可磨粉，若需以鼻胃管餵食，請告知醫師。

■ 注意事項

1. 對寬心[®]錠或其他類似藥物（硝化甘油）過敏，請勿使用此藥。
2. 寬心[®]錠不可和威而鋼[®]併用。
3. 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有心血管疾病、腎臟病，及正服用其他藥物，尤其是心血管用藥者，請先告知您的醫師。
4. 寬心[®]錠可能會讓您覺得頭暈，在未確定此藥對您有何影響之前如需開車或操作危險機械，請務必特別注意。
5. 請按時回診，讓醫師了解您的疾病改善情形。
6. 請遵照醫師指示避免抽菸、喝酒。
7. 請勿未經醫師同意自行停用寬心[®]錠，因為藥品需要慢慢降低劑量才能停藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

症狀	如何處理
頭痛	通常在服藥數天到數星期，頭痛症狀會消失，若持續頭痛，則詢問醫師是否可服用頭痛藥。未經醫師同意不可擅自服用頭痛藥或增減本藥之劑量
眼花、口乾、劇烈頭痛、皮疹	若症狀持續且嚴重時，立刻與醫師聯繫
過敏反應（臉和手水腫、口咽部水腫或刺痛、胸痛、呼吸困難） 嚴重暈眩、心跳減慢、嚴重胸痛 心悸、意識混淆、低燒、視覺模糊	若發生這些副作用，請立刻與醫師聯繫
嘴唇、指甲、掌心發紫，暈眩、呼吸困難、虛弱、心跳快速	此為劑量過量時的症狀。出現這些症狀時，立刻躺下或坐下，若症狀持續或昏倒時，請立刻送醫

■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0027

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮