

藥品使用指導單

克流感膠囊 (Tamiflu 75mg) 泡製口服懸浮液方法

克流感膠囊為一對抗流行性感冒病毒藥物，為避免藥品磨粉、分包造成的汙染，讓您服用更精確的劑量，克流感膠囊若不是整顆吞服時，請依照以下說明與冷開水混製成適量的口服懸浮液使用。

■ 配製方法

1. 將所有克流感膠囊自鋁箔中取出
2. 將所有膠囊剝開，將其藥粉全部倒入提供藥瓶，膠囊外殼丟棄
3. 加入所需冷開水並緩慢振搖瓶身，直至藥瓶上的刻度為止
4. 蓋上瓶蓋，用力振搖均勻
5. 量杯量取所需藥量服用



| 勾選 | 總顆數 | 調配總體積 | 使用方式 |
|--------------------------|-----|-------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 4顆 | 20ml | 每日兩次，早晚飯後服用 2ml x 5天 |
| <input type="checkbox"/> | 6顆 | 30ml | 每日兩次，早晚飯後服用 3ml x 5天 |
| <input type="checkbox"/> | 8顆 | 40ml | 每日兩次，早晚飯後服用 4ml x 5天 |

■ 注意事項

1. 請使用本院所提供之空瓶配製，配製後懸浮液濃度為15mg/ml。
2. 配製後懸浮液易沉澱，使用前請充分搖勻後，立即以藥杯量取所需用量服用
3. 保存方式：室溫下可放置5天，請在配製後按時間服用完畢。
4. 必要時，可在每次服用前量取好的藥杯中加入果糖調味。

■ 忘記服藥時該怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0030

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮