

藥品使用指導單

威克癌[®]錠 (Alkeran[®] 2mg)

■ 藥品成分名

Melphalan

■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.9 公分； 標記：[GX EH3] [A]

■ 作用

威克癌[®]錠為一種抗腫瘤藥物，能殺死癌細胞。目前用於局部惡性黑色素瘤、多發性骨髓瘤、軟組織肉瘤、神經母細胞瘤與其他相關癌症。

■ 用法

此藥需空腹服用（飯前 1 小時或飯後 2 小時），請依照醫師指示的時間服用。

■ 注意事項

- 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
- 若您有服用以下藥物，如：阿斯匹靈、止痛劑、抗凝血劑等請告知您的醫（藥）師。
- 若沒有限水的問題，請多攝取不含咖啡因的液體，但應該避免攝取含酒精性飲料。
- 使用後可能會造成尿液呈咖啡色或橘色。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受化療期間或化療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
- 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒，若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：噁心及嘔吐、便秘、腹瀉、胃痛、虛弱、疲倦、頭暈、頭痛、失眠、皮膚乾癢、脫水。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 下述症狀若有持續或加重：疲勞、喉嚨或口腔內疼痛，請告知您的醫師。
- 若有下述症狀，請立刻通知您的醫師：嚴重腹瀉、手或腳紅腫、麻木或疼痛、發燒、寒顫、喉嚨痛、胸痛、發疹、食慾降低、嚴重嘔吐等。

■ 保存方法

- 此藥需冷藏儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0033

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮