

藥品使用指導單

無鬱寧®膜衣錠 (Luvox® 50mg)

■ 藥品成分名

Fluvoxamine

■ 藥品外觀

白色，圓凸形，錠劑；大小：0.9 公分；標記：[S][291]

■ 作用

無鬱寧®膜衣錠是用來調整情緒或治療強迫症

■ 用法

- 請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。
- 建議在晚上服用
- 將藥物與水吞服，請勿咬碎。

■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 服藥期間請勿飲酒。
- 服用藥物可能造成視力模糊、嗜睡，請避免操作機械及開車。
- 服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

1. 此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用太過擔心：腸胃不適、便秘、口乾、視力模糊、嗜睡。
- 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

■ 保存方法

- 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0035

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮