

藥品使用指導單

安定文®錠 (Ativan® 0.5mg)

安心平®注射劑 (Anxicam® 2mg/Amp)

■ 藥品成分名

Lorazepam

■ 藥品外觀

- 口服：淺藍，圓扁形，錠劑；大小：0.5 公分；標記：[0.5]
- 針劑：棕色玻璃，澄清液體；字體為黃色

■ 作用

安定文®錠/安心平®注射劑是一種苯二酚（Benzodiazepine）類的藥物，可用於治療焦慮；注射劑型也可用在癲癇發作、改善化療後的噁心及嘔吐、讓麻醉劑的效果更好。

■ 用法

- 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
- 注射劑型由專業的醫療人員注射給予。

■ 注意事項

- 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
- 若需要進行其他手術或牙科處置時，請先行告知醫生。
- 使用此藥品前請勿喝含酒精性的飲料或使用其他中樞神經抑制劑。
- 使用此藥品後請勿開車或操縱精密的儀器，並小心走路預防可能發生的跌倒。
- 在手術前需告訴醫生或藥師是否有其他並存的疾病（例如：中風、憂鬱症、心臟疾病、青光眼、肝腎疾病、肺部及呼吸道的疾病、帕金森氏症、癲癇、重症肌無力等等）。
- 若有服用其他藥物（包括保健食品）請先告知醫生或藥師。
- 若有計劃懷孕（或是已經懷孕）及哺乳婦女者，請先告知醫生。
- 對苯二酚（Benzodiazepine）類過敏者須在使用前告知醫生。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：嗜睡、暈眩、疲倦、頭痛、噁心、皮膚癢、情緒不穩、暫時性的失憶等；以上副作用通常只會出現在治療初期，繼續服用後通常副作用都會漸漸消失。
- 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：憂鬱、睡眠障礙、激動、心跳加快、眼睛變黃、講話困難、無法控制肌肉等，請立即就醫！

■ 保存方法

- 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0039

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮