

藥品使用指導單

補斯可伴®糖衣錠 (Buscopan® 10 mg)

■ 藥品成分名

Hyoscine-N-butylbromide

■ 藥品外觀

白色，圓凸形，糖衣錠；大小：0.7 公分；無標記

■ 作用

補斯可伴®糖衣錠用於緩解平滑肌之痙攣，膽石症及膽囊炎發生之痙攣；輸尿管之痙攣。

■ 用法

- 盡量在每日同一時間服藥。
- 請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。

■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 前列腺肥大、閉尿、幽門狹窄者請勿投與此藥。
- 此藥物可能發生視力模糊的副作用，患者避免從事需精神集中或視力敏銳之工作，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。尤其是老年人，請特別注意。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於擔心：口乾、食慾不振、頭痛、心悸亢進。
- 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

■ 保存方法

- 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0042

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮