

藥品使用指導單

帝拔癲®持續藥效錠 (Depakine® Chrono 500 mg)

■ 藥品成分名

Valproic acid

■ 藥品外觀

白色，圓形，雙凸錠劑；大小：1.8 公分

■ 作用

帝拔癲®持續藥效錠為口服的抗癲癇製劑，主要治療各種癲癇發作，也可有效且快速治療躁鬱症患者的急性躁症。除此之外亦有預防偏頭痛的效用。

■ 用法

- 如有胃不適症狀，請與食物併服。
- 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
- 請整顆吞服，不可剝半或嚼碎。

■ 注意事項

- 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 在進行所有外科或牙科手術前應告知醫師你在正在服用帝拔癲®持續藥效錠。
- 本藥品易與其他藥品產生交互作用，影響藥效或增加副作用發生的風險，若您需使用其他藥品，請與您的醫師及藥師聯繫並確認。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：咳嗽、流鼻水、打噴嚏、疲倦。
- 上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：嚴重嘔吐、不正常出血、皮膚紅腫、癲癇控制不好。
- 服用帝拔癲®持續藥效錠可能導致眩暈及嗜睡的副作用，服用時避免從事需要集中注意力的事如開車或操作機械。注意力易不集中或容易跌倒，請小心。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0050

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮