

藥品使用指導單

希普利敏[®]液 (Cypromin[®] 0.4 mg/mL)

■ 藥品成分名

Cyproheptadine

■ 藥品外觀

瓶裝，透明澄清糖漿液，棕色蓋子。

■ 作用

希普利敏[®]液是用以治療各種過敏症及搔癢症，如：過敏性鼻炎、皮膚炎、蕁麻疹及氣喘。

■ 用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。
3. 開封後室溫可保存 1個月。

■ 注意事項

1. 對於青光眼、狹窄性胃潰瘍之患者及新生兒，請勿投與此藥物。
2. 此藥亦有促進食慾的效果。
3. 此藥物會產生頭痛、暈眩、思睡、有倦怠感之症狀，患者避免從事需精神集中之工作，並且慎防跌倒。
4. 服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於擔心：噁心嘔吐、頻尿、暈眩頭暈、發疹。
2. 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

■ 保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0052

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮