

藥品使用指導單

杜化[®]液 (Duphalac[®] Solution 666 mg/mL)

■ 藥品成分名

Lactulose

■ 藥品外觀

白色瓶裝，黃色澄清黏稠液體

■ 作用

杜化[®]液可用於緩解慢性便秘、或降低血中氨的濃度。

■ 用法

- 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
- 治療劑量依個人情況而定，服用後 24 到 48 小時產生藥效。

■ 注意事項

- 假如您有糖尿病、懷孕、授乳、或正在服用其他藥物，須先告知您的醫生。
- 便秘治療數天後沒有反應或再復發，應向醫師詢問。
- 若使用於乳糖不耐症的患者，應考慮乳糖的含量。
- 使用於治療便秘的劑量應通常不會對糖尿病患這形成問題。使用於肝昏迷的劑量較高，可能需要加以考量。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 若發生腹痛、噁心、食慾不振或引起水瀉時應減量或停藥。
- 若腹絞痛持續嚴重且有不尋常之腹瀉，請立即停藥並就醫。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄，開封後可在室溫下保存1到2星期。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 預防藥物造成跌倒

- 使用緩瀉劑會增加病患如廁頻率，故在病患上下床間請攙扶以防跌到，病患於如廁時應注意地板是否積水以防滑倒。
- 盡量於光線良好、視線佳的地方活動，在活動範圍內請多留意障礙物以免絆倒摔跤。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0058

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮