

藥品使用指導單

憂停®膜衣錠 (Eutac® 150 mg)

■ 藥品成分名

Moclobemide

■ 藥品外觀

淡黃，橢圓形，錠劑；大小：1.45 公分；標記：[ST][150]

■ 作用

憂停®膜衣錠具有調節情緒作用。

■ 用法

- 盡量在每日同一時間服藥。
- 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝臟疾病，應告知您的醫師及藥師。
- 已知對本藥產生過敏反應者不建議使用。
- 避免飲用啤酒、食用乳酪類及醃製類食物。
- 服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥，不可一次服用雙倍的藥量。
- 若是已經忘記服藥太多次時請回診就醫。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

每一種藥都有副作用，若發生以下情形，請您不用過於擔心：睡眠障礙、焦慮、暴躁、暈眩、頭痛、視力改變與皮膚過敏（紅疹、搔癢、蕁麻疹、發紅）等，大部分可因持續治療而消失。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0061

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮