

藥品使用指導單

富祿靜[®]膜衣錠 (Flurazin F.C[®] 5 mg)

■ 藥品成分名

Trifluoperazine

■ 藥品外觀

明藍色，圓扁形，錠劑；大小：0.83 公分；標記：[JCP，5]

■ 作用

富祿靜[®]錠為口服抗精神病製劑，主要適應症為精神病狀態，攻擊性與破壞性之行為障礙。

■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
- 劑量應隨個人加以調整，每個患者均應自最低有效劑量開始使用。
- 如要結束療程，建議在一到兩個星期內逐漸降低劑量，病患切勿自行停藥。

■ 注意事項

- 若您有計畫（已）懷孕、哺乳、肝腎功能不全、心血管疾病、癲間病史之病人，請主動告知您的醫師或藥師。
- 投與本藥物可能會影響駕駛和機械操作能力，行此類動作時請加以注意。
- 服用福祿靜膜衣錠，易造成姿勢性低血壓，暈眩，椎體外徑作用，例如震顫，肌肉僵直，混亂、感覺遲鈍、姿勢不穩並有經常跌倒等副作用。
- 服用此藥的期間，需特別注意跌倒的預防，請勿由躺著或坐著突然站立，尤其是初次使用，長期使用病患服用劑量的增加，或是年老之病患。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥，不可一次服用雙倍的藥量。
- 若是已經忘記服藥太多次時請回診就醫。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：不眠、頭暈、便秘，興奮。
- 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：心臟疾患之惡化，持續高熱，意識障礙等請立即就醫！

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0063

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮