

藥品使用指導單

瘤克寧[®]錠 (Leukeran[®] 2 mg)

■ 藥品成分名

Chlorambucil

■ 藥品外觀

深紅橙色，圓扁形，錠劑；大小：0.60 公分；標記：[GXEG3，L]

■ 作用

瘤克寧[®]錠為一種抗腫瘤藥物。

■ 用法

1. 按照醫生的指示時間服用。
2. 因藥品易受食物影響，空腹（飯前 1 小時或飯後 2 小時）服用效果較好。

■ 注意事項

1. 若您已知對此類藥物過敏或有癲癇或正在服用抗癲癇藥物，請先告訴您的醫師。
2. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
3. 若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。
4. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
5. 若您有服用以下藥物，如：阿斯匹靈、止痛劑、抗凝血劑、大蒜、人蔘、銀杏或維他命E等等，請在服用這些藥物前告知您的醫師。
6. 使用這個藥物後應定期回診追蹤檢查，並且將身體狀況告知您的醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

1. 使用本藥後可能會造成噁心或嘔吐，以少量多餐的方式並且多漱口以加強口腔衛生。
2. 使用本藥後可能比較容易出血，所以必須小心避免受傷；建議使用軟毛牙刷和電動刮鬍刀，以避免皮膚和牙齦出血。
3. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、咳嗽、寒顫、喉嚨痛。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0071

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮