

藥品使用指導單

鋰齊寧[®]膠囊 (Ligilin[®] 300 mg)

■ 藥品成分名

Lithium carbonate

■ 藥品外觀

淡黃橙色，長圓柱形，硬膠囊；大小：3 號；標記：[SOLVAY][7512]

■ 作用

鋰齊寧[®]膠囊用於情緒改善與調節。

■ 用法

請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

■ 注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有腎、心臟疾病，應告知您的醫師及藥師。
2. 已知對本藥產生過敏反應者不建議使用。
3. 服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

每一種藥都有副作用，若發生以下情形，請您不用過於擔心：噁心、腹瀉、眩暈、手指顫抖、多尿、口渴、肌肉無力、昏睡、厭食、便秘、胃腸道不適、頭痛等。當上述的症狀若持續且加重，請與您的醫師聯絡。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0073

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮