

# 藥品使用指導單

## 普治敏<sup>®</sup>錠 (Lonzumín<sup>®</sup> 25 mg)

### ■ 藥品成分名

Bucizine dihydrochloride

### ■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；大小：0.6 公分

### ■ 作用

普治敏<sup>®</sup>錠為口服的抗組織胺製劑，用於治療蕁麻疹、因過敏引起之鼻炎、氣喘、皮膚炎，同時對昆蟲螫傷、暈車、暈船、噁心嘔吐也有效。

### ■ 用法

1. 請於飯後服用。
2. 若為一天一次宜於晚上或睡前服用。
3. 若為防止暈車、暈船，應於出發前一小時服用。
4. 5-12 歲小孩劑量應減半。

### ■ 注意事項

1. 幼兒安全劑量尚未完全建立，應經醫師藥師指示使用。
2. 孕婦禁用本藥。
3. 從事駕駛及操作重型機械者，請謹慎使用，預防意外發生。
4. 由於本藥可能引起嗜睡，避免因注意力不集中，造成跌倒情形發生。
5. 服用期間避免喝酒。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

1. 此藥可能會有嗜睡、口乾、頭痛、緊張等現象，若有上述情形不必驚慌，可於睡前服用，可避免這些不便。
2. 服藥後，若有輕度低血壓眩暈、嗜睡、食慾不振、口、喉、鼻乾燥、視覺模糊、視神經過敏等現象出現，應立即停止用藥並就醫。
3. 服用此藥物可能會產生頭暈、嗜睡、視覺障礙等副作用，可能增加患者跌倒的風險性，請多加注意。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0074

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮