

藥品使用指導單

鈉催離®持續性藥效膜衣錠 (Natrlix® 1.5 mg)

■ 藥品成分名

Indapamide

■ 藥品外觀

白色，圓凸形，錠劑；大小：0.81 公分；標記：無

■ 作用

鈉催離®持續性藥效膜衣錠為口服的利尿劑。主要用以治療高血壓。

■ 用法

- 1.請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
- 2.每隔 24 小時服用一錠，最好於早晨服用。
- 3.本劑應以水吞服，不可嚼碎。

■ 注意事項

- 1.請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
- 2.若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 3.懷孕婦女絕對不可服用此類利尿劑，其有危害胎兒發育的危險性。
- 4.服用鈉催離®持續性藥效膜衣錠不會影響警覺性，但有些病人可能受血壓降下影響，尤其是治療初期，會影響開車或機械操作。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 1.若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 2.若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 3.不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：頭暈、疲倦、消化不良、皮膚疹。
2. 服用本藥品可能會增加病患如廁的頻率，由病床至如廁的整個過程容易跌倒，須小心注意。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0079

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮