

# 藥品使用指導單

## 溫諾平<sup>®</sup>軟膠囊 (Navelbine<sup>®</sup> 20 / 30 mg)

### ■ 藥品成分名

Vinorelbine

### ■ 藥品外觀

Navelbine<sup>®</sup> 20 mg：淺黃色，長圓柱形，軟膠囊；標記：[N20]

Navelbine<sup>®</sup> 30 mg：淺粉紅色，長圓柱形，軟膠囊；標記：[N30]

### ■ 作用

溫諾平<sup>®</sup>軟膠囊會干擾您體內癌細胞的生長，可用於治療癌症。

### ■ 用法

1. 請依照醫師指示按時服用，不可自行增減藥量或任意停藥。
2. 請於用餐時以水整顆吞服，不可嚼食或剝開膠囊，補充足夠水分以增加尿液排出量。
3. 在服藥期間應避免大量飲用葡萄柚汁。

### ■ 注意事項

1. 若您曾對此類藥物過敏，請先告訴您的醫師。
2. 曾有肝、腎、肺臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
3. 因膠囊內含藥品具有刺激性，不慎接觸膠囊內液時（如不慎嚼食或咬破膠囊），請使用大量清水漱口。破損的膠囊不可吞食，請退還醫師或藥師處理。
3. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
4. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
5. 使用這個藥物後應定期回診追蹤檢查，並且將身體狀況告知您的醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：頭暈、疲倦、消化不良、皮膚疹。
2. 服用本藥品可能會增加病患如廁的頻率，由病床至如廁的整個過程容易跌倒，須小心注意。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0080

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮