

藥品使用指導單

諾瓦得士[®]錠 (Nolvadex[®] 10 mg)

■ 藥品成分名

Tamoxifen

■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.80 公分；標記：[NOLVADEX，10]

■ 作用

諾瓦得士[®]錠可阻斷體內雌性激素之作用，用於乳癌輔助治療藥品，並預防復發。

■ 用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 如果是每日服用一次的話，可於早晨一次服用；如果是分成每日兩次服用的話，可於早晨和傍晚各服用一次。
3. 可於飯前或是飯後服用。

■ 注意事項

1. 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
2. 有肝、腎、心臟疾病、高膽固醇血症，應告知您的醫（藥）師。
3. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
4. 盡量避免或減少含酒精性飲料的攝取，避免飲用大量葡萄柚汁，以免影響藥品的代謝及療效。

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

1. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：疲倦、虛弱、喉嚨痛、關節疼痛、陰道搔癢或有分泌物。
2. 若有下述症狀，請告知您的醫師：胃痛、噁心嘔吐、胸部疼痛，呼吸短促，手或腳發紅、發熱及腫脹，手腳麻或無力，頭暈、頭痛。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0084

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮