

藥品使用指導單

苯巴比特魯[®]錠 (Phenobarbital[®] 30 mg)

■ 藥品成分名

Phenobarbital

■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；標記：十字刻痕

■ 作用

苯巴比特魯[®]錠特別用於癲癇大發作。

■ 用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 可空腹或與食物併服。

■ 注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 須定期看醫生檢查治療進度，若需調整劑量、停藥或改用其他藥物，須以遞減方式避免癲癇復發。
3. 若為老年人、肝腎功能不佳的患者，需謹慎評估後給予。
4. 會分泌至母乳中，因此不建議在治療期間哺乳。
5. 酒精會增加此藥的鎮靜作用，盡可能避免。

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

1. 常見的副作用為暈眩、嗜睡、頭痛、注意力不集中、興奮（特別在小孩）。
2. 有時會發生食慾不振、噁心嘔吐等副作用。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0087

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮