

# 藥品使用指導單

## 理思必妥<sup>®</sup>錠 (Risperdal<sup>®</sup> 3 mg)

### ■ 藥品成分名

Risperidone

### ■ 藥品外觀

鮮黃色，長圓柱形，錠劑；大小：1.4 公分；標記：[Ris，3]

### ■ 作用

理思必妥<sup>®</sup>錠為口服抗精神病製劑，主要適應症為精神分裂症之相關症狀、雙極性疾患之躁症發作、失智症病人具嚴重攻擊性或精神分裂症之類似症狀。

### ■ 用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 如果是每日服用一次的話，可於早晨一次服用；如果是分成每日兩次服用的話，可於早晨和傍晚各服用一次。

### ■ 注意事項

1. 失智老人使用此藥與利尿劑並服，尤其是本院的Rasitol<sup>®</sup>（來喜妥錠），要小心以防脫水。
2. 本藥應小心使用於已知有心臟血管疾病或相關危險、肝腎功能不全患者，如果您有相關疾病請主動告知您的醫師或藥師。
3. 使用本藥可能會影響駕駛和機械操作能力，執行此類動作時請加以注意。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：失眠，躁動不安，焦慮，頭痛。
2. 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：嗜眠、視力模糊、高燒、肌肉僵直等請立即就醫！

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0091

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮