

# 藥品使用指導單

## 救癲易<sup>®</sup>膜衣錠 (Sabril<sup>®</sup> 500 mg)

### ■ 藥品成分名

Vigabatrin

### ■ 藥品外觀

白色，橢圓形，錠劑，大小：1.70 公分，標記：[SABRIL]

### ■ 作用

救癲易<sup>®</sup>錠為癲癇之輔助療法藥物。

### ■ 用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 可飯前或飯後服用
3. 不適用於單獨治療給藥

### ■ 注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 須定期看醫生檢查治療進度，若需調整劑量、停藥或改用其他藥物，須以遞減方式避免癲癇復發。
3. 老年人或腎功能不全之患者，應考慮調整劑量或服用次數，避免副作用產生。
4. Vigabatrin會分泌至母乳中，因此不建議在治療期間哺乳。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

1. 於成人，大部份可能發生的副作用會與中樞神經系統有關，如鎮靜作用、嗜眠、疲倦、注意力不能集中。若在孩童身上，則較常發生興奮或精神激昂。其餘發生率較高的副作用為視覺障礙。
2. 若上列副作用發生後，症狀愈趨嚴重，請務必立即停藥後回診告知醫師或藥師。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0093

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮