

# 藥品使用指導單

## 得舒緩<sup>®</sup>錠 (Tarceva<sup>®</sup> 150 mg)

### ■ 藥品成分名

Erlotinib

### ■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；標記：[TARCEVA 150]

### ■ 作用

得舒緩<sup>®</sup>膠囊為會干擾您體內癌細胞的生長，可用於治療癌症，例如肺癌。

### ■ 用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 必須空腹服用，建議飯前一小時或飯後兩小時服用。

### ■ 注意事項

1. 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
2. 有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫（藥）師。
3. 在服用Aspirin（或含Aspirin的藥品）、維他命E或食用大蒜、銀杏、人參等之前，先告知您的醫師或藥師，諮詢其意見。
4. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
5. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
6. 若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、手或腳水腫、視力模糊、胸悶、糞便或尿液顏色變深、頭暈、倦怠、發燒、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、體重減輕、落髮。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0099

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮