

藥品使用指導單

特莫斯[®]膠囊 (Tamos[®] 20/100 mg)

■ 藥品成分名

Temozolomide

■ 藥品外觀

- Tamos[®] 20 mg：橘黃色/白色，硬膠囊；標記：[LP / 605]
- Tamos[®] 100 mg：粉膚色/白色，硬膠囊；標記：[LP / 206]

■ 作用

特莫斯[®]膠囊為一種抗腫瘤藥物，能殺死癌細胞而用來治療癌症。

■ 用法

按您的醫師指示服用，因藥品易受食物影響，空腹（飯前1小時或飯後2小時）服用效果較好。

■ 注意事項

- 若您已知對此類藥物過敏或達卡巴仁（Dacarbazine）過敏或有出血的問題時，請先告訴您的醫師。
- 有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫（藥）師。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
- 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
- 若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、落髮、頭暈、頭痛。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0100

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮