

藥品使用指導單

賽得®膠囊 (Thado® 50 mg)

■ 藥品成分名

Thalidomide

■ 藥品外觀

黃橙/白雙色，長圓柱形，膠囊；標記：[THADO][THADO]

■ 作用

- 治療癲癇性結節性紅斑（俗稱癲癇病）。
- 治療多發性骨髓瘤的搭配療法，若需進一步資訊，可請教您醫（藥）師。
- 作用在於調節免疫功能及抑制血管生長。

■ 用法

按您的醫師指示服用，因藥品易受食物影響，空腹（飯前1小時或飯後2小時）服用效果較好。

■ 注意事項

- 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
- 在服用本藥品前，請務必確認您已詳讀使用同意書並簽章。
- 若您正在懷孕或準備懷孕，請告知您的醫（藥）師，本藥可能會傷害胎兒，導致畸形；若在接受本藥品處方治療期間計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時確實做好避孕，以避免懷孕。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

1. 服藥後常有想睡、疲倦、頭昏等副作用，建議您在睡前或晚餐後一小時服用本藥物。
2. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：疑似或發現懷孕、發燒、血壓嚴重下降、心跳加快、紅斑性的皮膚疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、落髮、頭暈、頭痛、口乾、手腳麻、水腫、視力模糊。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0101

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮