

藥品使用指導單

妥泰[®]膜衣錠 (Topamax[®] 100 mg)

■ 藥品成分名

Topiramate

■ 藥品外觀

明黃橙，圓扁形，錠劑，大小：0.91 公分，標記：[TOP][100]

■ 作用

1. 成人及 2 歲以上兒童局部癲癇。
2. 預防偏頭痛。

■ 用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 可飯前或飯後服用。
3. 有錠劑及分散型膠囊 (Topamax sprinkle 25 mg)，兩種劑型，不建議將錠劑剝開，若為不能吞服錠劑的患者，如兒童與老年人，可將分散型膠囊剝開服用，不需咀嚼。

■ 注意事項

1. 若您計畫 (已) 懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 須定期看醫生檢查治療進度，若需調整劑量、停藥或改用其他藥物，須以遞減方式避免癲癇復發。
3. 肝腎功能不全之患者，應考慮調整劑量或服用次數，避免副作用產生。
4. 會分泌至母乳中，因此不建議在治療期間哺乳。

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

1. 較常見的副作用為輕至中度，包括暈眩、嗜睡、頭痛、視力模糊等。
2. 有時會發生食慾不振、噁心嘔吐等副作用。
3. 服用此藥物可能會產生暈眩、嗜睡、視力模糊等副作用，可能增加患者跌倒的風險性，請多加注意。
4. 患者若癲癇發作時，也會增加跌倒風險。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0104

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮