

# 藥品使用指導單

## 除癲達®膜衣錠 (Trileptal® 300 mg)

### ■ 藥品成分名

Oxcarbazepine

### ■ 藥品外觀

鮮橙黃色，長圓柱形，錠劑，大小：1.5 公分，標記：[CG，CG][TE，TE]

### ■ 作用

1. 局部癲癇發作之單一或輔助治療
2. 神經痛治療

### ■ 用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 通常為一天服用兩次。
3. 可飯前或飯後服用

### ■ 注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 須定期看醫生檢查治療進度，若需調整劑量、停藥或改用其他藥物，須以遞減方式避免癲癇復發。
3. 老年人或腎功能不全之患者，應考慮調整劑量或服用次數，避免副作用產生。
4. 會分泌至母乳中，因此不建議在治療期間哺乳。
5. 酒精會增加此藥的鎮靜作用，盡可能避免。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

1. 每種藥都可能產生副作用，若發生副作用時請勿驚慌，可與醫師或藥師聯絡，評估是否繼續服用。
2. 常見的副作用大多為輕微至中度，且為短暫性的。包括頭暈、嗜睡、疲倦、噁心嘔吐、視覺障礙。
3. 其餘可能發生的副作用為運動失調、眼球震顫。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.10.31
- PFS-7200-0106

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮