

藥品使用指導單

維泰寧[®]膠囊 (Vistaril[®] 25 mg)

■ 藥品成分名

Hydroxyzine

■ 藥品外觀

深綠/淺綠，長圓柱形，硬膠囊；大小：4 號；標記：[PFIZER][VIS-25]

■ 作用

維泰寧[®]膠囊為作用迅速、安全的安神藥，對焦慮緊張及精神神經質等情緒障礙又治療效果，同時不損害心智；此外具有些微骨骼肌鬆弛效果，具抗痙攣作用；另外還具有抗組織胺作用並且可抗嘔吐，作用良多。臨床上用於治療焦慮狀態，嘔吐及過敏疾患包括蕁麻疹、皮膚炎及搔癢。

■ 用法

1. 與精神病相關：成人一天四次，一次 50-100 毫克。
2. 與過敏症狀相關：成人每日三或四次，一次 25 毫克。
3. 飯前或飯後服用皆可。
4. 如果是每日服用一次的話，可於早晨一次服用；如果是分成每日兩次服用的話，可於早晨和傍晚各服用一次！

■ 注意事項

1. 若有肝臟及心臟方面疾病（心律不整），應先告知 醫生及藥師。
2. 病患服藥後，可能會嗜睡困倦及全身無力現象。當服用此藥從事駕駛、操作機械或複雜性工作者，應小心，同時避免因注意力不集中而有跌倒情形發生。
3. 授乳婦及孕婦禁止使用本藥。
4. 十二歲以下兒童較易出現中樞神經相關之副作用，譬如痙攣，須謹慎考慮。
5. 與其他鎮靜藥物併用會加重藥效及副作用，除非必要否則該避免。
6. 服藥期間避免喝酒。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

1. 副作用主要與中樞神經抑制或刺激、過敏反應等相關。
2. 最常見的副作用為困倦，通常是很短暫出現，且減少藥量會消失，另外暈眩、頭痛、失眠、鎮靜等也有可能發生。在高劑量使用下有可能產生口乾及便秘等現象。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 藥物過量該怎麼辦？

- 症狀：最常見的表現是過度鎮靜、痙攣、噁心及嘔吐等。
- 處理方式：立刻送醫處理進行一般性的支持療法並密切觀察病人，此藥物目前沒有特效解毒劑。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.11.01
- PFS-7200-0112

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮