

藥品使用指導單

必博寧® 持續藥效錠 (Buporin® SR 150 mg)

■ 藥品成分名

Bupropion

■ 作用

必博寧® 持續藥效錠適應症為憂鬱症、治療尼古丁依賴性，作為戒菸之輔助劑（自費）、以及調整食慾。

■ 用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

■ 注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫師及藥師。
2. 服藥期間應嚴密監視憂鬱症情形，以防發生自殺行為。
3. 禁用於對本藥過敏者和癲癇患者。

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：發燒、胸痛、全身衰弱、心博過速、姿勢性低血壓、血壓升高、癲癇發作、失眠、震顫及注意力障礙等。
2. 當上述的症狀若持續且加重，請與您的醫師聯絡。
3. 服用本藥治療期間，容易造成跌倒意外，請小心行動，以免發生危險。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 保存方法

- 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.11.01
- PFS-7200-0113

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮