

# 藥品使用指導單

## 穩舒眠®錠 (Winsumin® 12.5mg)

### ■ 藥品成分名

Chlorpromazine

### ■ 藥品外觀

紫色，圓凸形，大小：0.7 公分

### ■ 作用

穩舒眠糖衣錠為口服抗精神病製劑，主要適應症為噁心嘔吐，躁病，不停的打嗝。

### ■ 用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 劑量應隨個人加以調整，每個患者均應自最低有效劑量開始使用。
3. 如要結束療程，建議在一到兩個星期內逐漸降低劑量，病患切勿自行停藥。

### ■ 注意事項

1. 若您有計畫（已）懷孕、哺乳、肝腎功能不全、心血管疾病病史之病人，請主動告知您的醫師或藥師。
2. 使用本藥可能會影響駕駛和機械操作能力，執行此類動作時請加以注意。
3. 使用本藥請勿喝酒。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：頭暈，姿勢性低血壓，口乾，頭痛。
2. 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：心臟疾患之惡化，持續高熱，意識障礙等請立即就醫！

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

## ■ 注意跌倒之預防

1. 服用穩舒眠糖衣錠，易造成姿勢性低血壓，暈眩，椎體外徑作用，例如震顫，肌肉僵直，混亂、感覺遲鈍、姿勢不穩並有經常跌倒等副作用
2. 服用此藥的期間，需特別注意跌倒的預防，請勿由躺著或坐著突然站立，尤其是初次使用，長期使用病患服用劑量的增加，或是年老之病患。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 107.11.01
- PFS-7200-0114

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮